

**Producent:**

Interagro (UK) Ltd; Thorley Wash Barn; London Road; Thorley Bishop's Stortford; Hertfordshire CM23 4AT; tel.: +44 1279 714970; fax: +44 1279 758227

**Importer:**

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: [biuro@sumiagro.pl](mailto:biuro@sumiagro.pl), [www.sumiagro.pl](http://www.sumiagro.pl)

## FLEXI STRONG

Zawiera emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego

Agroglutynant. Preparat sklejający i powlekający. Obniża ryzyko osypywania i porastania nasion rzepaku, pęknięcia strąków roślin strączkowych, porastania ziarna zbóż przed zbiorem.

**P280** – Stosować ochronę oczu.

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**OPIS DZIAŁANIA:**

Preparat FLEXI STRONG zawiera w swoim składzie emulsję karboksylowanego kopolimeru butadienowo-styrenowego, która po zastosowaniu tworzy cienką powłokę w formie siateczki, dzięki czemu łuszczyzny rzepaku oraz strąki grochu, soi, łubinu i innych roślin strączkowych są mniej podatne na pęknięcie i osypywanie nasion a także na ich porastanie przed zbiorem. Zastosowanie w zbożach ogranicza ryzyko porastania ziarna w kłosach w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych przed zbiorem.

Po zastosowaniu preparatu FLEXI STRONG wszystkie fizjologiczne procesy życiowe w roślinach zachodzą w sposób niezakłócony, ponieważ kopolimerowa powłoka jest przepuszczalna dla powietrza i pary wodnej, a jednocześnie powłoka ta nie przepuszcza wody opadowej. Dzięki temu traktowane preparatem rośliny dojrzewają w sposób fizjologicznie niezakłócony, a nasiona rzepaku i roślin strączkowych oraz ziarno zbóż są mniej podatne na porastanie, gdyż nie są narażone na bezpośrednie działanie wody z opadów deszczu i rosy w trakcie dojrzewania.

**STOSOWANIE**

*Rzepak ozimy i jary:*

Preparat należy stosować około 3–4 tygodnie przed zbiorem, gdy łuszczyzny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pęknięcia (BBCH 81-83).

*Rośliny strączkowe uprawiane na suche nasiona:*

Preparat należy stosować około 3–4 tygodnie przed zbiorem, gdy strąki zaczynają dojrzewać, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pęknięcia (BBCH 81-83).

*Zboża ozime i jare:*

Preparat należy stosować około 2-3 tygodnie przed zbiorem, w końcowej fazie dojrzałości woskowej ziarna (BBCH 87-89).

#### **DAWKOWANIE:**

Zalecana dawka: 0,5 l/ha. Zalecana

ilość wody: 250 – 400 l/ha.

Dawkę preparatu oraz ilość użytej wody należy dostosować do wielkości roślin i zagęszczenia łąnu.

#### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania dokładnie wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

#### **POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY**

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

#### **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU**

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie

zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA PREPARATU I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Preparat przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5<sup>0</sup>C i nie wyższej niż 30<sup>0</sup>C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcji do innych celów.

Opróżnione opakowania po produkcji zaleca się zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony lub można je potraktować jako odpady komunalne.

Okres ważności - 3 lata Data

produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....