


## Program ochrony i nawożenia jabłoni Sumi Agro Poland

chwasty	Trustee Hi-Aktiv*								
mączniak prawdziwy	Kendo								
mszyce	Mospilan <sup>50 EW</sup>	Mospilan <sup>50 EW</sup>							
owocówka jabłkowieczka	ISOMATE <sup>CIS</sup>	ISOMATE <sup>CIT</sup> + Mospilan <sup>50 EW</sup>							
zwójki	ISOMATE <sup>CIS</sup>								
owocnica jabłkowa	Mospilan <sup>50 EW</sup>								
toczyk gruszoziacek	Mospilan <sup>50 EW</sup>								
pryszczarek jabłoniak	Mospilan <sup>50 EW</sup>								
ogrodnica niszczyliska	Mospilan <sup>50 EW</sup>								
bawełnica korówka*	Mospilan <sup>50 EW</sup>								
porzeczniak jabłoniowy	Ortus								
przędziorki (owocowiec, chmielowiec)	NEMITE								
	Ortus (stadia ruchome)								
	Missonium <sup>5Treeq</sup> (jaja, larwy)	Missonium <sup>5Treeq</sup> + Ortus							
nawożenie dolistne	TOPARI Cynk	TOPARI Cynk TOPARI Horti; Magnez							
	Slippa								
środki pomocnicze	Slippa								
	kinactiv <sup>initial</sup>								
	kinactiv <sup>fruit</sup>								
biostymulatory	shigeki								
	kaishi								
	POCZĄTEK WEGETACJI	ZIELONY PĄK	RÓŻOWY PĄK	KWITNIENIE	OPADANIE PEŁEKÓW	WZROST ZANĄŻKÓW	WZROST OWOCÓW	ZBIORY	OKRES SPOCZYNKU

\* zalecenia w uprawach małoobszarowych

Kendo 50 EW

Przed kwitnieniem z mączniakiem trzeba ostro!



## Nasi przedstawiciele i doradcy

**ARKADIUSZ BUJALSKI**  
tel. 501 625 157  
arkadiusz.bujalski@sumiagro.pl

**GRZEGORZ KUPISZ**  
tel. 509 476 220  
grzegorz.kupisz@sumiagro.pl

**DOMINIK ŁUKOWIAK**  
tel. 505 444 124  
dominik.lukowiak@sumiagro.pl

**SŁAWOMIR STANKIEWICZ**  
tel. 506 090 906  
slawomirstankiewicz@sumiagro.pl

**MONIKA KRZYWAK**  
tel. 511 409 646  
monika.krzywak@sumiagro.pl

**RAFAŁ CHORAŻY**  
tel. 505 319 505  
rafal.chorazy@sumiagro.pl

**MARIUSZ STANIEK**  
tel. 502 072 506  
mariusz.staniek@sumiagro.pl

**RADOSŁAW ZARYCHTA**  
tel. 501 281 757  
radoslaw.zarychta@sumiagro.pl

**MARIOLA REDZIMSKA**  
tel. 512 379 871  
mariola.redzimska@sumiagro.pl

**ARTUR KULIKOWSKI**  
tel. 508 384 909  
artur.kulikowski@sumiagro.pl

**JACEK PREUSS**  
tel. 501 281 648  
jacek.preuss@sumiagro.pl

**JERZY KŁOS**  
tel. 501 281 662  
jerzy.klos@sumiagro.pl

**JUSTYNA WASIAK**  
tel. 512 379 877  
justyna.wasiak@sumiagro.pl

FUNGICYD

# Kendo

50 EW

SKUTECZNY  
JUŻ OD 5°C!

## Przed kwitnieniem z MĄCZNIAKIEM trzeba ostro!

Dla najlepszego efektu stosuj jak najwcześniej, od fazy różowego pąka. Zwalczaj mączniaka i parcha w jednym zabiegu!\*



\* Przy stosowaniu łącznym z preparatami parchobójczymi, zawierającymi trifloksystrobinę lub difenokonazol.

Dołącz do nas na:

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.  
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | [www.sumiagro.pl](http://www.sumiagro.pl)



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.



### Zwalczaj mączniaka na początku wegetacji dla najlepszego efektu!

- **Fazy zielonego i różowego pąka** to krytyczny czas dla prawidłowego rozwoju jabłoni, decydujący o jakości i wielkości plonu.
- Presja mączniaka jest w tym czasie zazwyczaj bardzo duża – atakuje on liście, młode pędy i pąki.
- Porażone przez mączniaka części roślin nie mogą się prawidłowo rozwijać, pąki nie zawiązują owoców.
- **Bardzo ważne jest zwalczanie mączniaka w tej fazie** – wykonane wówczas zabiegi zatrzymują rozprzestrzenianie się choroby i mają istotny wpływ na dalszy rozwój roślin oraz ich plon.
- Środki mączniakobójcze najlepiej stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

#### Kendo 50 EW łączy w sobie różne mechanizmy oddziaływania na patogeny

- Skuteczne **działanie przeciw różnym** stadiom rozwojowym grzyba.
- Działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające (na wczesnym etapie infekcji) – **możliwość elastycznego wyboru terminu zabiegu**.
- **Doskonałe działanie translaminarne i gazowe** – zwalczanie patogenu już obecnego na roślinie oraz zabezpieczenie przed rozwojem nowych infekcji.
- **Zabezpieczenie nowych przyrostów** rośliny dzięki dobremu działaniu systemicznemu.

Produkt dostępny w opakowaniach: 0,25 l; 0,5 l; 1 l.



### Możliwość przeprowadzenia 2 zabiegów w sezonie!

W uprawie jabłoni stosuj zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, **JAK NAJWCZEŚNIEJ** – od fazy różowego pąka do końca fazy, gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 57–75).

#### 1. wariant – jednozabiegowy – przy spodziewanej dużej presji mączniaka

(sprzyjające warunki, odmiany podatne na mączniaka)

- z chwilą pojawienia się pierwszych oznak choroby,
- Kendo 50 EW w dawce 0,4–0,5 l/ha.


#### 2. wariant – dwuzabiegowy – przy umiarkowanej presji mączniaka

I zabieg

- przed lub na początku kwitnienia,
- Kendo 50 EW w dawce 0,2–0,3 l/ha + preparat parchobójczy\*.

II zabieg

- koniec kwitnienia – opadanie płatka,
- Kendo 50 EW w dawce 0,2–0,3 l/ha + preparat parchobójczy\*.



\* Zawierający trifloksystrobinę lub difenokonazol.

### Zwalczaj mączniaka i parcha w jednym zabiegu!



Najwyższa skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego na początku sezonu, **od fazy różowego pąka**.



**Działanie już od 5°C** – wcześniejszy oprysk w porównaniu z innymi produktami, przekładający się na wyższą skuteczność ochrony.



**Zwalczanie parcha i mączniaka** w jednym zabiegu\*\*.



Możliwość stosowania produktu **samodzielnie lub w mieszaninach**.



**Brak wykształczonej odporności** patogenu na substancję czynną produktu.



Do stosowania w uprawach **jabłoni, gruszy, winorośli**.



\*\* Przy stosowaniu łącznym z preparatem parchobójczym zawierającym trifloksystrobinę lub difenokonazol.