

Producent:

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A. Avda. del Cadí 19-23, Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Olèrdola, Barcelona, www.futurecobioscience.com

Importer:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

KAISHI MAX**Biostymulator niemikrobiologiczny****Zawiera L-aminokwasy pochodzenia roślinnego****Certyfikat CE 006402-2025**

Kaishi Max to produkt w postaci granulatu zawierający aminokwasy pochodzenia w 100% roślinnego w wysokim stężeniu, przeznaczony do stymulacji wzrostu roślin i ochrony upraw w warunkach stresu (np. wysokie temperatury, mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin). Kaishi Max stymuluje ważne procesy fizjologiczne i metaboliczne zachodzące w roślinach uprawnych, wspomagając ich rozwój wegetatywny.

Kaishi Max można stosować nalistnie lub poprzez nawadnianie użyźniające (dodając produkt do wody do nawadniania) w okresach, w których niezbędne jest pobudzenie metabolizmu w celu przyspieszenia procesów rozwojowych, a także w okresach szczególnej wrażliwości na zmiany środowiskowe.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

SKŁAD:

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ	% W/W
Wolne L-aminokwasy	80,0
N łącznie	13,5
Azot organiczny	12,0
Aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych. Standardowy aminogram: kwas L-glutaminowy, kwas L-asparaginowy, L-alanina, L-arginina, L-feniloalanina, glicyna, L-histydyna, L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-prolina, L-seryna, L-tyrozyna, L-treonina, L-tryptofan, L-walina. Zawartość żadnego z nich nie przekracza 20% całości.	

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P102 – Chronić przed dziećmi

P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

P280 – Stosować rękawice ochronne

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40°C

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu

OPIS DZIAŁANIA:

Wolne L-aminokwasy zawarte w Kaishi Max stymulują procesy metaboliczne w roślinie, które ulegają zachwianiu w sytuacjach stresowych dla roślin. Po zastosowaniu Kaishi Max rośliny łatwiej przechodzą okresy stresowe i szybciej się regenerują ponieważ L-aminokwasy wpływają korzystnie na fotosyntezę, wzmocnienie ścian komórkowych i pracę aparatów szparkowych. Ponadto powoduje wzrost kondycji rośliny i wspomaga syntezę fitohormonów.

STOSOWANIE

Uprawa	Zalecana Liczba zabiegów	Zalecana Dawka (kg/ha)	Terminy
Warzywa z siewu i z rozsady	1 – 3	0,3	1. We wczesnych fazach rozwoju, ale po rozwinięciu rozety liści (warzywa z siewu) 2. Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe 3. W późniejszych fazach rozwoju w okresach stresowych dla rozwoju roślin (np. susza, duże wahania temperatury, przymrozki itp.)
Truskawka	1 – 3	0,3	1. Od końca fazy wegetatywnej (przed kwitnieniem) do okresu wybarwiania owoców
Zboża	1 – 3	0,3	1. Wiosną w fazie krzewienia roślin 2. W fazie początku strzelania w źdźbło 3. W fazie liścia flagowego
Kukurydza	1 – 3	0,3	1. W fazie 2-8 liści 2. Po okresach chłodu, suszy, przymrozków, gradu itd.
Burak cukrowy	1 – 3	0,3	1. Przed zwarem międzyrzędzi 2. Po okresach suszy lub nadmiernego uwilgotnienia
Ziemniak	1 – 3	0,3	1. Przed zwarem międzyrzędzi 2. W okresie intensywnego rozwoju części nadziemnej i formowania bulw
Rośliny ozdobne	1	0,4	1. Po przesadzeniu, w trakcie całego cyklu rozwojowego

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha (warzywa 200-1000 l/ha). W zależności od uprawy i użytego sprzętu. Zgodnie z zaleceniem dla danej uprawy.

Odstęp między zabiegami: 14- 21 dni

UWAGI:

1. Preparat Kaishi Max można używać do mieszanin zbiornikowych jednak przed zastosowaniem nowych, niesprawdzonych wcześniej mieszanin – zwłaszcza z udziałem kilku składników – zaleca się przeprowadzić test na małym obszarze. (szczególnie przed zastosowaniem w uprawach specjalistycznych – warzywa)
2. W przypadku stosowania preparatu Kaishi Max w mieszaninie ze środkami ochrony roślin lub nawozami dolistnymi, należy przestrzegać wszystkich uwag i zaleceń jakie obowiązują dla środków ochrony roślin i nawozów z którymi stosuje się preparat.
3. Podczas stosowania produktu solo i w mieszaninach należy przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Rolniczej a w przypadku stosowania w mieszaninach ze środkami ochrony roślin również zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin.
4. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Importerem – firmą Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość preparatu wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Podczas sporządzania cieczy użytkowej złożonej z kilku komponentów, należy przestrzegać zapisów oraz zaleceń dotyczących mieszania, zawartych w etykietach tych produktów. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację,
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować okulary ochronne lub maskę zabezpieczającą twarz

Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów wykonanych z gumy nitrylowej.

Stosować odzież ochronną – prać regularnie.

Zapewnić właściwą wymianę powietrza. Unikać wdychania par.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA PREPARATU I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Preparat przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła

Przechowywać w optymalnej temperaturze – nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po produkcie do innych celów.

Opróżnione opakowania po produkcie zaleca się zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony lub można je potraktować jako odpady komunalne.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji – na opakowaniu

Nr partii – na opakowaniu