

SKUTECZNA OCHRONA RZEPAKU

zaczyna się
od monitoringu!



Prawidłowe monitorowanie szkodników to pierwszy i najważniejszy krok, który pozwala uniknąć strat plonu i ograniczyć liczbę zabiegów insektycydowych. Tylko monitoring pozwala wykryć początek nalotu i zadziałać w momencie największej podatności szkodników.

Monitoring metodą żółtych naczyń



Ustawienie naczynia

Umieścić naczynia ok. 20 m od brzegu pola, najlepiej przy nieużytkach lub drzewach.



Przygotowanie płynu


Wlej wodę z płynem do naczyń lub płynem zimowym (w razie przymrozków).



Wychwytywanie chrząszczy

Żółte naczynia łapią pierwsze nalatujące chrząszcze.

Czerpakowanie rzepaku – metoda uzupełniająca



Jak wykonać czerpakowanie?

Zamaszyste ruchy czerpakiem omiatające wierzchołki roślin. Ruch w kształcie „U” lub „8”.



Liczba uderzeń i trasa

- Start od brzegu pola.
- Ok. 20 m w głąb plantacji.
- 25 uderzeń czerpakiem.



Ocena wyniku

- Wysyp zawartość czerpaka.
- Policz odłowione szkodniki.
- Biała kartka ułatwia obserwację.

Progi szkodliwości insektów rzepaku

Wczesna wiosna

CHOWACZ BRUKWIACZEK

10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2-3 chrząszcze na 25 roślinach

CHOWACZ CZTEROZĘBNY

20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach

Faza pąkowania

SŁODYSZEK RZEPAKOWY

BBCH 50-52:

1-2 chrząszcze na roślinie

BBCH 55-59:

3-5 chrząszczy na roślinie

Kwitnienie i zawiązywanie łuszczyń

CHOWACZ PODOBNIK

1 chrząszcz na 1 roślinie

PRYSZCZAREK KAPUSTNIK

1 muchówka na 3-4 rośliny



Wiosenne naloty chowaczy ruszają, gdy temperatura powietrza osiąga 10-12°C, a gleby 5-7°C. **Nie daj się zaskoczyć!** Kiedy monitoring wykaże zagrożenie, zabieg należy wykonać szybko, zanim samice złożą jaja.

Postaw na sprawdzone insektycydy!

inazuma

**INAZUMA 130 WG –
bezpieczny start
sezonu.**

Działa już od 5°C,
błyskawicznie
uderza w pierwszą
falę szkodników.



Mospilan[®] 20 SP

**MOSPILAN 20 SP –
pewność i bezpie-
czeństwo zapylaczy.**

Skuteczny m.in.
na chowacze,
słodyszka i naloty
mieszane w okresie
kwitnienia.

**Razem środki te tworzą technologię,
która:**

- działa od pierwszych ciepłych dni aż po opadanie płatków,
- zabezpiecza łan przed wszystkimi kluczowymi szkodnikami wiosny,

- minimalizuje ryzyko niepowodzenia zabiegów,
- łączy szybkość, skuteczność i bezpieczeństwo ekologiczne,
- wspiera wykorzystanie pełnego potencjału plonowania.

Pamiętaj, monitoring to **mniej strat, większa skuteczność i wyższy plon.**



Więcej o monitoringu, progach szkodliwości i zwalczaniu szkodników na katalogsumiagro.pl/monitoring-rzepaku
ZESKANUJ KOD!

